



## Instrucciones para el cuidado después de la operación

¡Gracias por castrar/esterilizar a su mascota! Aunque la castración y la esterilización son procedimientos comunes, **recuerde que su mascota acaba de ser sometida a una OPERACIÓN** y que necesita cuidados apropiados para recuperarse, incluido un lugar **bajo techo limpio, cálido y seco**.

**VACUNAS** Si su mascota recibió alguna vacuna, obsérvela para detectar los siguientes síntomas:

- dificultad para respirar
- inflamación en la cara
- urticaria
- vómitos
- letargo o depresión
- inflamación en el lugar en que se colocó la vacuna (hombro derecho para la vacuna triple felina y la vacuna triple canina, y pata posterior derecha para la rabia)
- pérdida del apetito

***Si se observan estos síntomas, llame a la línea de cuidados posoperatorios al 877-SPAY-NYC (877-772-9692) y elija la opción 3.***

**MICROCHIPS** Si su mascota recibió un microchip:

- durante las primeras 24 horas, no cepille, acicale, bañe ni acaricie al animal excesivamente en el área del microchip y no permita que su mascota juegue de manera brusca con otros animales o con personas.

No le suministre **AGUA NI ALIMENTOS** hasta el momento indicado por el personal de la clínica móvil. Muchos animales no comerán la noche que regresen al hogar después de la operación.

- Si su mascota tiene menos de 16 semanas de edad, necesitará una pequeña comida la noche después de la operación. Si la joven mascota no quiere comer, puede frotarle las encías con jarabe de arce o Karo. Para hacerlo, coloque una pequeña cantidad de jarabe sobre su dedo y frótelo sobre las encías de su mascota.
- No obligue a su mascota a comer, pero ofrézcale alimentos y agua frescos nuevamente por la mañana.
- **NO** le quite el collar isabelino a su mascota para alimentarla, a menos que pueda estar con ella durante todo el tiempo que no lo lleve puesto. **VUELVA A COLOCARLE** el collar isabelino inmediatamente después de que el animal termine de comer.

**MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR** Se le suministró a su mascota un medicamento para el dolor de larga duración antes de darle el alta y no necesitará más medicamentos. No le suministre medicamentos para humanos; es peligroso y podría resultar fatal para su mascota.

**LAMIDAS EN EL LUGAR DE LA OPERACIÓN** Evite que su mascota se lama el lugar de la operación. El collar isabelino de su mascota debería evitar que se lama. Utilice este collar durante 7 a 10 días.

- Si aun así el animal puede lamerse el lugar de la operación, mientras usa el collar, comuníquese con la línea de cuidados posoperatorios para recibir instrucciones.

**HÁBITOS DE EVACUACIÓN** Su mascota debería evacuar (ir al baño) después de 48 horas de la operación. Comuníquese con la línea de cuidados posoperatorios si su mascota no va al baño después de 48 horas. El estrés causado por la operación puede ocasionarle diarrea a su mascota. Si esto ocurriera, ofrézcale acceso ilimitado a agua y suminístrele una dieta de pollo hervido y arroz únicamente durante 3 días; si la diarrea continúa o si el perro está también aletargado o parece



### **Instrucciones para el cuidado después de la operación**

gravemente enfermo, comuníquese con la línea de cuidados posoperatorios. Observe la orina para detectar si contiene sangre. Puede presentarse una pequeña cantidad durante las primeras 24 horas posteriores a la operación. Si esto persiste o si el animal parece enfermo, llame a la línea de cuidados posoperatorios.

**ARENA PARA GATOS para gatos MACHOS** El polvo de la arena para gatos puede introducirse en el lugar de la operación y provocar una infección. En la caja de arena para gatos, debe utilizarse papel triturado, una marca de arena llamada *Yesterday's News* (puede comprarse en una tienda de mascotas) o granos de arroz largos sin cocinar durante, al menos, una semana después de la operación.

**LIMITE LOS SALTOS Y JUEGOS** durante 7 días. Demasiada actividad puede hacer que se abra el lugar de la operación. Para evitar que su mascota esté demasiado activa:

- Póngala en un portamascotas, en una caja o en una habitación pequeña cuando no pueda verla.
- Si su mascota es pequeña, álcela para subir y bajar las escaleras. ***\*Vea la hoja adjunta para obtener instrucciones sobre cómo levantar y llevar alzada a su mascota.***
- Pasee a su mascota con una correa para permitirle ir al baño. No lleve a su mascota a caminatas largas ni le permita que juegue de manera brusca con otros animales o con personas, o que salte sobre o desde los muebles.

**MANTENGA A SU MASCOTA ALEJADA DE OTROS ANIMALES** Mantenga a los machos alejados de las hembras que no han sido esterilizadas. Los machos castrados pueden preñar a una hembra que no ha sido esterilizada por hasta 30 días después de la operación. Cuando los animales regresan de la clínica pueden oler diferente a los otros animales del hogar; esto puede causar peleas entre los animales, por lo tanto, esté preparado para mantenerlos en áreas separadas.

**LUGAR DE LA OPERACIÓN** Controle el lugar de la operación diariamente para asegurarse de que esté cicatrizando.

- Comuníquese con la línea de cuidados posoperatorios si, en el lugar de la operación, aparece una secreción verde/amarilla o un olor desagradable, o si hay un hematoma o un bulto que aumenta de tamaño.
- Es normal que sienta un pequeño bulto sólido. Puede colocar una compresa fría sobre el bulto en el lugar de la operación para aliviar la inflamación.
- No hay puntos en el exterior del lugar de la operación. Los puntos están debajo de la piel. Ambos bordes del corte están unidos con un pegamento de uso médico. Estos puntos se disuelven, por lo que no es necesario regresar a la clínica para sacarlos. **No aplique ningún producto en el lugar de la operación a menos que los técnicos de cuidados posoperatorios se lo recomienden.**
- **Gatos machos:** El lugar de la operación en los gatos machos es tan pequeño que no necesita cerrarse con pegamento de uso médico. Es normal que vea uno o dos pequeños orificios en su escroto.

**EL BAÑO DE SU MASCOTA** Puede bañar a su mascota 10 días después de la operación.

- Si la baña antes de que transcurra ese período de tiempo, el lugar de la operación puede abrirse y esto puede demorar la cicatrización.

**VÓMITOS** Su mascota puede vomitar después de la operación.



### **Instrucciones para el cuidado después de la operación**

- Si su mascota hembra vomita después de la operación, comuníquese con la línea de cuidados posoperatorios, ya que es posible que necesite atención. Si su gato macho experimenta varios episodios de vómitos, podría correr riesgo de deshidratarse. Por lo tanto, comuníquese con la línea de cuidados posoperatorios.

**TENDENCIA A ESCONDERSE** Es posible que los gatos se escondan después de la operación.

- Es importante hacer que su mascota se sienta segura y cómoda. Coloque al gato en un área reducida y tranquila, como el baño, el lavadero o la cocina, con las luces apagadas. Provéale agua y alimentos frescos, y una caja de arena limpia. Bloquee cualquier acceso a lugares donde el gato podría esconderse.

**COMPORTAMIENTO** La castración o esterilización puede reducir o eliminar ciertos comportamientos no deseados, como marcar el territorio con orina, agredir o montarse, pero es posible que estos comportamientos ya se hayan 'incorporado' y no desaparezcan completamente.

- Los gatos machos pueden tardar hasta 30 días en dejar de marcar su territorio y las gatas pueden tardar la misma cantidad de tiempo para dejar de mostrar signos de celo. Es posible que los gatos machos mayores sigan marcando su territorio, pero su orina no olerá tan mal. Es posible que las gatas mayores sigan mostrando signos de celo (aullidos, llantos), pero no pueden quedar preñadas.

**Si su mascota experimenta problemas relacionados con la operación, llame al *877-SPAY-NYC (877-772-9692)*, opción 3. Tenga en cuenta que si no se siguen las instrucciones para el cuidado posoperatorio, es posible que ASPCA no cubra el costo de la cita para el nuevo control y los cuidados relacionados. Antes de recibir los cuidados de un veterinario para una complicación posoperatoria, debe comunicarse con la línea de cuidados posoperatorios.**